

Verniz de Flúor

Colgate Duraphat®

Para o Dentista



Para uso em consultório

Verniz de Flúor Colgate Duraphat® é indicado para prevenção, controle e tratamento clínico da cárie dentária em pacientes com risco de cárie.

- Alta concentração de flúor, 22.600ppm (NaF 5%) para uma maior proteção contra a cárie
- Efetivo na redução de lesões de cárie em dentes permanentes de 46% vs. 21% de flúor em gel.^{1,2}
- É recomendada a aplicação a cada 6 meses para um efeito comprovado na redução de lesões de cárie, ou de acordo com a sua recomendação e/ou risco de cárie de seu paciente.
- Fácil manipulação, rápida aplicação e endurecimento em contato com a saliva. Alta aderência e permanência na estrutura dental.
- Ideal para pacientes com hipomineralização de esmalte
- Experiência e eficiência clínica comprovadas por mais de 45 anos.

1. Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Barnices fluorados para la prevención de caries dentales en niños y adolescentes. Reproducción de una revisión Cochrane, traducida y publicada en la Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 2.

2. Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. One topical fluoride (toothpastes, or mouthrinses, or gels, or varnishes) versus another for preventing dental caries in children and adolescents (Review). This is a reprint of a Cochrane review, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library, 2009, issue 1.

Com o verniz de flúor

Colgate®

Duraphat®



Colgate®

A MARCA Nº 1 EM RECOMENDAÇÃO DOS DENTISTAS

Instruções de uso

Para uso em consultório



1 Realize profilaxia em todas as superfícies e remova o biofilme dental interproximal com fio ou fita dental.*

*Em casos em que o paciente já tenha escovado os dentes e usado o fio dental, pode-se aplicar o verniz de Flúor Colgate Duraphat® sem necessidade de profilaxia.



2 Isole a área com abridor de boca e/ou rolo de algodão.



3 Coloque uma quantidade de Verniz de Flúor em um bloco de papel ou pote dapping de borracha.



4 Com um pincel, aplique uma camada fina de Verniz de Flúor Colgate Duraphat® nas superfícies dentárias vestibulares, linguais, palatinas e oclusais ou conforme necessidade.

Recomendações para o paciente

- Não ingerir líquidos por 2 horas e alimentos sólidos nas 3 horas seguintes após a aplicação.
- Não escovar os dentes nas 12 horas após a aplicação.
- Em pacientes pediátricos, recomende ingerir algum alimento antes da aplicação devido a contra-indicação de ingestão de alimentos nas horas que seguem à aplicação do verniz.

- Cada aplicação custa apenas R\$ 2,68¹
- Cada Duraphat de 10 ml pode trazer R\$ 3.490 de receita para o consultório²

¹ Rende 50 aplicações quando utilizada a quantidade média recomendada de 0,2 ml por boca.

² Cálculo baseado no valor da aplicação tópica de verniz fluoretado da tabela de valoração de procedimentos CBHPO da CNCC.

Solicite o verniz de flúor

Colgate

Duraphat[®]

na Casa Dental de sua preferência.

Ligue **0800 703 30 40**

Para mais informações acesse

www.colgateprofessional.com.br

Colgate[®]

A MARCA Nº **1** EM RECOMENDAÇÃO DOS DENTISTAS