

De acordo com o seu risco de cárie é aconselhável a aplicação de Duraphat:

A cada 6 meses ou 2x ao ano

A cada 4 meses ou 3x ao ano

A cada 3 meses ou 4x ao ano

Data da aplicação:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Próxima aplicação:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

PARA O PACIENTE

Faça um tratamento especializado para  
**prevenção e controle**  
da cárie dentária  
e tenha dentes mais saudáveis



Com o verniz de flúor

**Colgate**

**Duraphat**<sup>®</sup>

você estará protegido por 6 meses, graças à liberação lenta e progressiva de flúor.

**Colgate**

A MARCA Nº 1 EM RECOMENDAÇÃO DOS DENTISTAS

**Colgate**

A MARCA Nº 1 EM RECOMENDAÇÃO DOS DENTISTAS

Verniz de Flúor

**Colgate**

**Duraphat**<sup>®</sup>



**46%** mais efetivo na redução de lesões de cárie em dentes permanentes vs. 21% de flúor em gel<sup>1,2</sup>

## Sabe porque a cárie é formada?

Porque não há uma remoção efetiva da placa bacteriana.

## Como podemos preveni-la?

- Com uma correta escovação acompanhada de um creme dental com flúor
- Realizando visitas regulares ao dentista
- Reduzindo o número de vezes em que consumimos açúcares diariamente.

## Recomendações para o paciente após aplicação do verniz de flúor Colgate Duraphat<sup>®</sup>

- Não ingerir líquidos nas próximas 2 horas seguintes após a aplicação.
- Não ingerir alimentos sólidos nas próximas 3 horas seguintes após a aplicação.
- Não escovar os dentes nas 12 horas seguintes após a aplicação, deixe o verniz atuar sobre seus dentes para que se forme uma camada protetora com a maior quantidade de flúor possível.

## LEMBRE-SE:

**Os resíduos de verniz que permanecerem em seus dentes serão removidos durante a escovação ou com o uso do fio dental 12 horas após a aplicação.**

1. Mariño VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Barnices fluorados para la prevención de caries dentales en niños y adolescentes. Reproducción de una revisión Cochrane, traducida y publicada en la Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 2. 2. Mariño VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. One topical fluoride (toothpastes, or mouthrinses, or gels, or varnishes) versus another for preventing dental caries in children and adolescents (Review). This is a reprint of a Cochrane review, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in the Cochrane Library, 2009, issue 1.